

# színezetlen Medasept

Bőrfertőtlenítőszer, sebészi bemosakodó  
és higiénés kézfertőtlenítőszer



## Általános leírás

A MEDASEPT SZÍNEZETLEN alkoholos hatóanyagokat tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező bőrfertőtlenítő-, sebészi bemosakodó és kézfertőtlenítőszer. A MEDASEPT SZÍNEZETLEN színtelen, jellegzetes illatú készítmény, amely bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt.

## Alkalmazási terület

Egészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, stb.), injekciók, punkciók, vérvételi előtti fertőtlenítésre, műtéti bőrterület fertőtlenítésére, higiénés kézfertőtlenítésre, sebészi kézfertőtlenítésre és sebészi bemosakodásra használható.

## Tulajdonságok

- Nagyon gyors fertőtlenítést tesz lehetővé
- Aldehydmentes
- Bőrkímélő hatásánál fogva rendszeres használat esetén sem szárítja a bőrt, meggátolja a bőr kirepedezését.

## Összetétel

Etanol (83,5 %); bifenil-2-ol (0,15%); Benzil-alkohol (0,8-1,2 %); Tejsav, Víz

## Hatásspektrum

- Baktericid (MRSA is)
- Fungicid
- Virucid (Hepatitis B és HIV inaktíváló)
- Tuberkulocid

## Alkalmazási koncentráció és behatási idő

A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni

### Bőrfertőtlenítés esetén:

<u>Műtéti beavatkozás előtt</u> a bőrfertőtlenítés ideje:	0,5 perc behatási idő min. 3 perc
(Faggyúmirigyekben gazdag bőrterület fertőtlenítése:	10 perc behatási idő)
<u>Sebészi bemosakodás esetén:</u>	5 x 1 perc behatási idő
<u>Higiénés kézfertőtlenítés esetén:</u>	0,5 perc behatási idő
(Virucid hatás eléréséhez)	min. 1 perc behatási idő
(Tuberkulocid hatás eléréséhez)	min. 1 perc behatási idő

## A fertőtlenítés végrehajtása

### Bőrfertőtlenítés

Injekciók, punkciók előtt a bőrfelületet 0,5 perc behatási ideig kezeljük a készítménnyel. Műtéti beavatkozás előtt a műtéti terület környékét kezeljük a készítménnyel, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A beavatkozás csak ezután, minimálisan 3 perc elteltével kezdhető.

színezetlen  
Medasept

színezetlen  
**Medasept**

#### Sebészi bemosakodás

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet 1 percig alaposan eldörzsölünk a kézen és az alkarokon, majd a műveletet még négyszer megismételjük. A sebészi bemosakodáshoz szükséges fertőtlenítőszer mennyisége: 5 x 5 ml = 25 ml. A sebészi bemosakodás ideje: 5 x 1 perc = 5 perc.

#### Higiénés kézfertőtlenítés

Az adagolóból 5 ml készítményt juttatunk a tenyérbe, melyet a hatás eléréséhez szükséges ideig (normál fertőtlenítés 30 mp, egyéb hatás (virucid, tuberkulocid) hatás eléréséhez 1 perc) alaposan eldörzsölünk a kéz bőrén.

#### Figyelmeztetés

- Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
- Csak ép bőrfelületen alkalmazható!
- Nyálkahártyákon nem alkalmazható!
- Nyílt láng közelében alkalmazni tilos!
- Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni!

#### Tárolás, eltarthatóság

Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, szobahőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve 3 évig eltartható.

Szállítási besorolás: UN 1993 RID/ADR 3 II.

Engedélyszám: JKF/10884-4/2016.

A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be.

A teljes gyártási folyamat során érvényes tanúsítással rendelkező GMP és ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.

Forgalmazó:

Plum Magyarország Kft.

Tel./Fax: +36 88 326006 / info@plum.hu / www.plum.hu / www.plum24.com